

# Cidine®

CINITAPRIDA

## Criterios diagnósticos de Dispepsia Funcional (Roma IV)<sup>1</sup>.

### Dispepsia funcional

#### Criterios diagnósticos

- Presentar uno o más de los siguientes síntomas:
  - Plenitud postprandial molesta.
  - Saciedad precoz molesta.
  - Epigastralgia molesta.
  - Ardor epigástrico (acidez) molesto.
- No existir evidencia de ningún trastorno orgánico que pueda explicar la enfermedad (el estudio debe incluir la endoscopia oral).

Se deben cumplir ambas condiciones y los criterios del PDS y/o del EPS.

Los criterios deben estar presentes en los últimos tres meses, con inicio de los mismos, al menos, seis meses antes del diagnóstico.

**Tabla 1.** Criterios diagnósticos de dispepsia funcional (Roma IV). PDS: síndrome de distrés postprandial; EPS: síndrome de dolor epigástrico; ERGE: esofagitis (o enfermedad) por reflujo gastroesofágico; SII: síndrome de intestino irritable. Extraída de Stanghellini V, et al. (2016)<sup>2</sup>.

CidiOmni24-08-ABRIL-2024

PDS: Síndrome de distrés postprandial, EPS: Síndrome de dolor epigástrico.

1. <https://semergen.es/files/docs/biblioteca/guias/levogastrol%20monografia%20Criterios%20Roma%20IV%20monografia...pdf>

2. Stanghellini V, Chan F, Hasler W, et al. Gastrointestinal Disorders. Gastroenterology. 2016;150(6):1380-1392.