


DUODART

Cápsulas (dutasterida/tamsulosina HCl)

- **DUODART** fue significativamente **superior** a ambas monoterapias en la **reducción del riesgo de progresión clínica de la HPB**¹.



- **Retrasar el inicio del tratamiento con DUODART más de 6 meses**, aumenta significativamente el riesgo de Retención de Orina/Cirugía en comparación de cuando se inicia de forma inmediata².



- El cambio de fármacos 5-ARI puede asociarse con un cambio clínicamente significativo en la velocidad del PSA, poniendo a los pacientes en riesgo de biopsias innecesarias³.



DuoLand24-12-Abril-2024

HBP: Hiperplasia Benigna de Próstata; **5-ARI:** Inhibidores de la 5-alfa-reductasa; **PSA:** Antígeno prostático específico

1. Roehrborn et al. The Effects of Combination Therapy with Dutasteride and Tamsulosin on Clinical Outcomes in Men with Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia: 4-Year Results from the CombAT Study. *European Urology*. 2010; 57: 123 – 131. 2. D'Agate S et al. "Impact of early vs. delayed initiation of dutasteride/tamsulosin combination therapy on the risk of acute urinary retention or BPH-related surgery in LUTS/BPH patients with moderate-to-severe symptoms at risk of disease progression". *World J Urol*. 2021; 39(7): 2635-2643. 3. Cózar JM, Hernández C, Miñana B, Morote J, Alvarez-Cubero MJ. Papel del antígeno prostático específico ante las nuevas evidencias científicas, una nueva actualización en 2020. *Actas Urol Esp*. 2021; 45:21-29.

 **RECORDATI**